

Silhouette

Tête

Queue

Ailes





Croupion

Vol

Nom

Forme Dessin

Contraste



Faucon pèlerin



Faucon hobereau



Faucon crécerelle



Faucon crécerellette



Faucon émerillon




Aigle royal



Percnoptère d'Égypte




Pygargue à queue blanche




Gypaète barbu




Vautour fauve



Circaète Jean le Blanc



Busard saint Martin ♂



Busard des roseaux ♂



Busard des roseaux ♀




Aigle botté



Buse pattue



Aigle de Bonelli





















Bondrée apivore ou Buse variable



Circaète Jean le Blanc



Autour des palombes







www.fcpn.org

CRITERES D'OBSERVATION des rapaces diurnes en vol


Silhouette




Tête




Forme de la queue



Dessin de la queue




Croupion



Contraste des ailes

Vol



Epervier d'Europe	12	16	20	24	26
Balbusard pêcheur	10	17	21	25	27
Milan royal	9	18	22	25	28
Milan noir	10	19	21	25	29
Busard cendré ♀ ou Busard st Martin ♂	7	20	21	24	30
Busard cendré ♂	8	22	21	24	31
Aigle botté	8	23	16	25	32
Bondrée apivore ou Buse variable	8	20	19	24	33
Bondrée apivore ou Buse variable	8	22	20	25	
Buse pattue	8	23	20	25	

Clé de Sylvain Rose