


Observez les bourgeons

Voici quelques étiquettes présentant des détails d'observation de plusieurs espèces arbustives, assez communes dans les haies. Créez vos propres étiquettes en les adaptant aux espèces près de chez vous. Intégrez les espèces arborées pour compléter votre activité.



Utilisez ces étiquettes pour organiser un jeu d'observation des bourgeons sur le terrain en hiver. Ou un jeu d'association après une récolte de feuilles des arbustes.

Noisetier (*Coryllus avellana*)



Bourgeons axillaires alternes, disposés sur deux rangs le long du rameau couvert de poils, 5 mm, 7 à 8 écailles visibles. Pas de bourgeon terminal. Présence de boutons floraux.

CPN

Sureau noir (*Sambucus nigra*)



Bourgeons axillaires opposés, 5 à 9 mm, ovoïdes et allongés, plus ou moins écartés du rameau. Présence d'un bourgeon terminal.

CPN

Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*)



Bourgeons axillaires opposés, écailleux et brun verdâtre. Présence d'un bourgeon terminal un peu plus gros.

CPN


Troène commun (*Ligustrum vulgare*)



Bourgeons axillaires opposés, écailleux, pointus, arrondis, 2 mm de long et de large, vert bleuâtre. Présence d'un bourgeon terminal.

CPN

Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)



Bourgeons axillaires opposés, minces, allongés, pubescents et brun rouge sur rameaux parfois rougis par le soleil. Présence d'un bourgeon terminal.

CPN

Nerprun purgatif (*Rhamnus cathartica*)



Bourgeons axillaires opposés, écailleux, pointus, appliqués, 5 à 9 mm, brun-noir, sur rameau se terminant souvent par une épine. Présence d'un bourgeon terminal.

CPN

Viorne obier (*Viburnum opulus*)



Bourgeons axillaires opposés, bossus et allongés, couvert par une seule écaille. Présence non systématique d'un bourgeon terminal.

CPN

Saule marsault (*Salix caprea*)



Bourgeons axillaires alternes, écartés du rameau, écailleux, pointus et légèrement poilus. Pas de bourgeon terminal. Présence de boutons floraux nettement plus gros.

CPN

Prunellier (*Prunus spinosa*)



Bourgeons axillaires alternes, très petits (1 à 2 mm), globuleux, pubescents et brun foncé. Pas de bourgeon terminal. Présence de boutons floraux un peu plus gros.

CPN

Aubépine à un style (*Crataegus monogyna*)



Bourgeons axillaires alternes, écailleux, petits, arrondis et brun rouge. Présence d'un bourgeon terminal.

CPN


Bourdaie (*Frangula alnus*)



Bourgeons axillaires alternes, nus (sans écaille), couverts de poils denses, appliqués contre le rameau, brun roussâtre. Présence d'un bourgeon terminal plus gros.

CPN

Épine-vinette (*Berberis vulgaris*)



Bourgeons axillaires alternes, écailleux, 4 à 5 mm, ovoïdes, insérés à l'aisselle des épines, brun gris. Pas de bourgeon terminal.

CPN